

67

LEVEL BOOK

1990

TL  
HB  
T  
FF  
HF  
E  
TL  
HB  
T  
FF  
HF  
E  
TL  
HB  
T  
FF  
HF  
E

2カ入り

カ

1, 1+12カ

2カ

1-1カ

1-1カ

1カ

2カ

1カ

1カ

路上

淳謙合鳥家得博区  
道南)

5-6月 大森線長

4才一匹 飼費900

三圍鳥家得博区

氏同行

斜向け急勾

常山稔雜草(沢が)入り

樹古木も点在

木、木ら、コナ、トナリ

樹石主体と草が

林地も入り

には色々 持込の生  
草が

取山は沼と

石日/松木、草子の

土入り

路上

自然環境保全審議会鳥獣保護区  
現地調査 (道南)

1990年6月5-6日 大森 緑長  
6月5日 805 4本 - 延齢900

① 長万部町 燕園鳥獣保護区  
長万部町 辻氏 同行

斜面注意

地形が非常に複雑で沢が入り  
組み。広葉樹古木も点在。

ミズナラ 大木, ホウ, コナ, ナカサ  
キなど広葉樹が主体となり  
トドマツ造林地もあり

保護区としては好 <sup>特選地</sup>  
特別保護区には <sup>鳥獣</sup> 沼と  
湿地がある (接点部での  
の芽生えなど, 中には入水  
等があった)

この地帯は 9マの 500

ツツドリ

エゾシキ

小形 又中か田中 道路上  
で同群 54-6

① 森竹湯川鳥獣保護区  
花園地帯に比して地形は  
ゆるやかに傾斜した内  
部が三つある。一帯植  
林はハリギリ、アサキ、アヒロ  
コ、シキハタ、ミナノキ、カウ  
ラ、アサキ、アサキ、アサキ、アサキ  
主体とするが、アサキは40-50  
年生のもので、アサキ、アサキ  
地帯がある。

アサキ、アサキ、アサキ、アサキ  
アサキ、アサキ、アサキ、アサキ  
アサキ、アサキ、アサキ、アサキ  
アサキ、アサキ、アサキ、アサキ

特別保護区に <sup>地形も急峻</sup> 入りこむは  
アサキ、アサキ、アサキ、アサキ  
この保護区は  
この地形の一般の森林相  
をわらば比較的良好な  
環境にあり

6月6日

松前小島

AM 807 8:53 着  
島の大部分は草本帯であり、  
中央の凹部平坦地帯の中  
にハリギリの木がある。

島の南西海岸の崖地は巨大  
なアサキの繁茂地帯を有す。  
アサキのこの凹部は、  
南側海上に20羽の  
アサキを目撃。

島の東側斜面中腹の草本  
帯の中のアサキの巣穴が  
少しみられた(早鳥)

島の居住者(40年住人)は  
石山、アサキ、アサキと昔は  
島の東側斜面低部のアサキ  
が営巣していたが、今では  
アサキの営巣地が斜面上部  
へ移ったという。(昔は低部  
から営巣が始まり、上部は  
雪どけが遅いので繁茂も  
遅く始まったという) また  
政村は北部の斜面が

秋田沖地震の事前壊し  
したか。現在はこの上部に  
もう一つの草生地があるとい  
う。

放し飼いの大形犬2匹がおり  
うさぎ 24か、海鳥(特  
はクセキシイ)の繁殖地が影響  
らう。このあたりは、  
イソヒヨドリ

アマツバメ(多)  
北風泊の港上の水溜り  
(空)の中へうらうらとるすべし

イグサイマイ  
かたじけないといふ

6月6日

⑨ 知内所、福島所湯の沢  
鳥害の調査区  
大軒岳の西方登山口の麓にあり  
全体的に二次林で、また、か  
つての30年程の造林地がある  
河畔林は広葉樹林(22種  
のうち、かたじけなく、ハズシ  
下う。セン。)で、川の状況  
は良好、この付近の一般  
的森林相、特約区の下接  
木あり。近頃は、この  
遠望は他の地帯  
と同様の森林相

81990-6月14-15日

宇各 宮崎主幹 越前線  
14日 並珠 1000-1100  
夕未 維喉内鳥獣保護区

海岸に平行に339m位の  
砂丘があり、231m位は  
カシワの風倒し林が  
あり、その内側への砂丘は  
トドマツの林または  
トドマツとニセウツギとの  
広葉樹との混交林が  
あり

砂丘と砂丘の間には  
無数の泥炭地があり  
これ等の沼は、ここから  
しか知られて ~~内本~~

いそいそパイサの繁殖場  
と存っており、その他  
アカエリカイツブリ、キョウ  
人ジロ、茶臼多くの水鳥  
の繁殖場ともなる

その地帯の林内には多数の  
ヒゲマカシバの生れがあり

キツネはオオカブト多く、今回  
も1匹が沼の中で ~~捕~~ 撃たれた  
~~捕~~

維喉内附近では乾燥地が  
進んでおり、道路南側の沼は  
現在(21)から北側の沼  
(昭和36年 ~~キ~~ ニコパイサの  
繁殖地が最初に見出された所)  
は水面が干上がり沼底が  
21。

Sep. 10 '90  
当別 通民の森 降後、山本川  
シマツクリウ生息可能地  
調査

春山田平水地、青山ダム上流  
右岸 道傍林 12林班の  
湖岸域にはミスナラ大木  
(数好な樹洞あり) など  
あり、トドマツ 高木を混交  
するが、シマツクリウ生息地  
といはれ、餌場?

14林班 大滝沢河口部  
は 銚子池の改定地  
といはれ、ただ林の  
ものは少し弱く、大木  
が少なく、中針葉樹大木  
もない

当別川の中流部付近を  
(ラウネ十ヶ沢出口)

良好と見られる





新得町サボリシート 1991年9月26日


9月26日 13:30 札幌 築スーパースタジアム

15:50 新得町

ハズレト4500円







五光